

ZÁKLADNÍ OČKOVÁNÍ DĚTÍ – CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Očkování chrání dítě před nemocemi, které byly dříve časté a nebezpečné.

Mnohé z nich už dnes téměř nevidíme – právě **díky očkování**.

Níže najdete stručný přehled jednotlivých nemocí a očkovacích látek, které jsou součástí základního očkovacího kalendáře.

Hexavakcína – očkování od 2. měsíce věku, hrazeno pojišťovnou, POVINNÉ OČKOVÁNÍ (Očkování proti 6 nemocem: záškrt, tetanus, černý kašel, hepatitida B, dětská obrna, hemofilus typu B)

Nemoc	Proč je nebezpečná	Co očkování dělá
Záškrt (difterie)	Bakterie vytváří jed, který poškozují srdce, nervy a dýchací svaly. Může způsobit udušení.	Chrání proti toxinu bakterie.
Tetanus	Vzniká při poranění, bakterie z půdy uvolňují toxin, který vyvolá křeče a zástavu dechu.	Očkování vytvoří protilátky proti toxinu.
Černý kašel (pertuse)	Dlouhé záchvaty kašle, zvracení, u kojenců může dojít k zástavě dechu.	Očkování výrazně snižuje riziko těžkého průběhu.
Hepatitida B	Zánět jater, může přejít do chronického onemocnění a cirhózy.	Chrání proti přenosu krví, slinami i mateřským mlékem.
Dětská obrna (poliomyelitida)	Poškozují nervy, může způsobit trvalé ochrnutí.	Očkování zabránilo návratu obrny do Evropy.
Haemophilus influenzae typu B (Hib)	Způsobuje zánět mozkových blan, hrtanové příklopky (epiglottitidu) a těžké zápal plic.	Chrání před nejzávažnějšími infekcemi Hib.

Očkování proti pneumokokům (Vaxneuvance) – od 2. do 7. měsíce věku hrazeno pojišťovnou

- Chrání před **zánětem mozkových blan, středního ucha, plic a sepse**.
- Pneumokoková infekce může být u malých dětí i život ohrožující.
- Očkování snižuje i riziko opakovaných zánětů uší.

Očkování proti meningokokům (Bexsero hrazeno mezi 2.-12. měsícem věku, MenQuadfi hrazeno do 2 let)

- Meningokok způsobuje **sepse a zánět mozkových blan**, průběh bývá velmi rychlý a často fatální.
- Očkování chrání proti typům B (Bexsero) do 1 roku věku, A, C, W, Y (MenQuadfi) do 2 let věku.

Očkování proti rotavirům (Rotarix, Rotateq) – od 6. do 24. týdne věku, není hrazeno pojišťovnou

- Rotaviry způsobují **prudké zvracení, vodnaté průjmy a dehydrataci**, často vyžadující hospitalizaci.
- Očkování výrazně snižuje riziko těžkého průběhu i hospitalizace, i když nezabrání všem infekcím.
- Největší přínos má u **dětí s vyšším rizikem přenosu – např. pokud je doma starší sourozenec navštěvující kolektiv**. Podává se do pusinky, možno i jaké kombinace s jiným očkováním.

Očkování proti RS virům (Beyfortus) – od narození do 1 roku věku v první rizikové sezoně říjen-březen, hrazeno pojišťovnou

- RSV jsou **nejčastější příčina závažných zánětů dolních dýchacích cest** u kojenců, hlavně v 1. roce života, často s nutností hospitalizace až po závažné stavy s nutností intubace.

Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR) – očkování od 15. měsíce věku, hrazeno pojišťovnou, POVINNÉ OČKOVÁNÍ

Nemoc	Rizika
Spalničky	Vysoké horečky, záněty plic a mozku, dlouhodobé oslabení imunity.
Příušnice	Bolestivé zduření žláz, může způsobit zánět mozku nebo neplodnost u chlapců.
Zarděnky	Mírný průběh, ale velké riziko pro plod v těhotenství .

♥ Shrnutí pro rodiče

- Kombinované vakcíny (hexavakcína) snižují počet vpichů a stresu pro dítě.
- Očkováním chráníte nejen vaše dítě, ale i ostatní – zejména kojence, osoby s oslabenou imunitou, těhotné maminky
- Po každém očkování setrvejte 15 min v čekárně z důvodu možné akutní reakce
- Teplota, zarudnutí či zatvrdnutí místa vpichu po očkování jsou běžné a přechodné.
- Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat – cílem je, aby rodiče rozuměli nejen kdy ale i proč a jak očkujeme.

 MUDr. Olga Míčková, MUDr. Olga Lukačovičová

www.detskaordinace-mickova.cz

objednávkový a komunikační systém sestra EMMY – MUDr. Olga Míčková s.r.o.

